

مقاله کوتاه

القای بیهوشی در گربه ماهی پنگوسی *Pangasius sutchi* با استفاده از عصاره
سنبل الطیب *Valerian officinalis* و مقایسه آن با عصاره گل میخک *Eugenia*
caryophyllata

مریم یعقوبی^۱، فاطمه پیکان حیرتی^{۲*}، سالار درافشان^۲، صمد بهرامی باباحیدری^۱

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲- استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

پذیرش: ۹۲/۳۰

دریافت: ۹۲/۳/۷

* نویسنده مسئول مقاله: fheyрати@cc.iut.ac.ir

می توان برای بیهوشی در آبزیان استفاده کرد (Bagheri and Imanpour, 2011). عمده میخک مصرفی از سایر کشورها وارد می شود و در سال های اخیر قیمت آن به شدت افزایش یافته است، از این رو یافتن جایگزین برای آن می تواند مناسب باشد (Sadigh Eteghad et al., 2008). سنبل الطیب *Valeriana officinalis* یا علف گربه از خانواده Valerianaceae، از جمله گیاهانی است که شاید قابل جایگزینی با میخک باشد. این گیاه بوته ای استوار و چندساله دارد و به صورت وحشی در بیش تر مناطق ایران وجود دارد، از سنبل الطیب به عنوان والیوم گیاهی یاد شده است (Komori et al., 2006). پیش از این از عصاره ریشه این گیاه به عنوان ترکیب ضد استرس برای حمل و نقل ماهی دم شمشیری (Hajibeglou and Sudagar, *Xiphophorus helleri*


بیهوشی وضعیت زیستی است که در آن حواس به طور کلی یا جزئی مختل می شود (Gholipour Kanani et al., 2003). فرایند بیهوشی در آبزیان شامل ۴ مرحله است که در نهایت عملکردهای انعکاسی آبری متوقف می شود (Weber et al., 2011). مواد بیهوش کننده بر اساس کارایی، قابلیت دسترسی و بی خطر بودن برای طبیعت انتخاب می شوند (Bagheri and Imanpour, 2011). در حال حاضر ترکیبات مختلفی نظیر تری کائین متاسولفانات MS222 برای بیهوشی استفاده می شوند. در سال های اخیر استفاده از ترکیبات گیاهی برای القای بیهوشی در آبزیان بسیار توسعه یافته است (2007 Soltani, از گل و ساقه میخک *Eugenia caryophyllata* که حاوی ترکیب فنولی اوژنول-4-allyl) (Velisek et al., 2005) است 2-methoxyphenol)

سنجش شد. میزان تلفات تا ۴۸ ساعت پس از آزمایش ثبت شد. از SPSS نسخه ۱۹ برای تجزیه واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد. میانگین زمان القای بیهوشی با غلظت‌های ۲، ۳ و ۴ گرم در لیتر سنبل الطیب بسیار طولانی حدود ۱۶ تا ۱۸ دقیقه بود (شکل ۱- الف). اگرچه با افزایش دوز، زمان لازم برای القای بیهوشی کاهش یافت، اما این کاهش معنادار نبود (شکل ۱- الف، $p > 0/05$). متوسط زمان بیهوشی با گل میخک حدود ۴ دقیقه بود که به طور معناداری کم‌تر از زمان لازم برای بیهوشی با سنبل الطیب بود (شکل ۱- الف، $p < 0/05$). متوسط زمان احیای (دقیقه) در ماهیان بیهوش شده با سنبل الطیب در هر غلظت به طور معناداری طولانی‌تر از ماهیان تیمار شده با گل میخک بود (شکل ۱- ب، $p < 0/05$). با افزایش غلظت سنبل الطیب، زمان احیا به طور معناداری کاهش یافت (شکل ۱- ب، $p < 0/05$). با این وجود چنین تفاوتی برای گروه ماهیان بیهوش شده با گل میخک دیده نشد (شکل ۱- ب). متوسط تعداد حرکات سرپوش آبششی هر قطعه ماهی تحت تأثیر غلظت مختلف سنبل الطیب حدود ۱۸۰۰، ۱۳۰۰ و ۱۲۰۰ بود (شکل ۱- ج). متوسط این شاخص برای ماهیان تیمار شده با گل میخک به طور معناداری کم‌تر و در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ حرکت بود (شکل ۱- ج). روند مشابهی برای تعداد حرکات آبششی در حین احیا، از زمان قرارگیری در آب تازه تا هوشیاری کامل در ماهیان برای دو ترکیب بیهوش‌کننده مشاهده شد (شکل ۱- د). متوسط تعداد حرکت آبششی از حدود ۸۰۰ حرکت در ماهیان تحت تأثیر غلظت ۲ گرم در لیتر سنبل الطیب به حدود ۳۵۰ حرکت برای ماهیان بیهوش شده با دوزهای

2010 و بیهوشی ماهی حوض *Carassius auratus* استفاده شده است (Sadigh Eteghad et al., 2008). گربه ماهی *Pangasius sutchi* گونه‌ای از خانواده Pangasiidae، در کشور ایران یک گونه زینتی و در بسیاری از کشورها به عنوان ماهی خوراکی مطرح است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی امکان استفاده از سنبل الطیب، به عنوان ماده بیهوش‌کننده در مقایسه با گل میخک است. به این منظور گیاهان مذکور به صورت خشک از فروشگاه‌های معتبر خریداری شدند. پس از آسیاب کردن گیاهان، عصاره‌گیری به روش توصیف شده زیر برای هر دو گیاه به صورت یکسان صورت گرفت. ابتدا بخش موردنظر گیاه، آسیاب شده و پودر حاصل در غلظت‌های ۲، ۳ و ۴ گرم در لیتر در کیسه پارچه‌ای به مدت ۲۴ ساعت در آب جوشیده سرد شده قرار گرفت. تعداد ۳۰ قطعه ماهی پنگوسی (میانگین \pm انحراف معیار) طول و وزن به ترتیب $12/95 \pm 0/92$ سانتی‌متر و $16/85 \pm 3/52$ گرم در ۶ گروه، هر گروه حاوی ۵ قطعه ماهی تفکیک شدند. هر ماهی، به منزله، یک تکرار برای تیمار منظور شد. ماهیان به صورت انفرادی در محلول کاملاً هوادهی شده حاوی ۲، ۳ و یا ۴ گرم در لیتر از سنبل الطیب و گل میخک قرار گرفتند (Sadigh Eteghad et al., 2008). آزمایش در درجه حرارت $30 \pm 0/5$ °C، میزان اکسیژن محلول $0/15 \text{ mg/lit}$ و $6 \pm$ pH برابر $7/2 \pm 0/2$ اجرا شد. مدت زمان القای بیهوشی و تعداد حرکات سرپوش آبششی تا القای مرحله چهارم بیهوشی برای هر ماهی به طور جداگانه ثبت و پس از بیهوشی، ماهیان به آب تازه هوادهی شده منتقل شدند. زمان بازگشت از بیهوشی تا هوشیاری کامل و تعداد حرکات سرپوش آبششی تا هوشیاری نیز

بالاتر، ۳ و ۴ گرم در لیتر به طور معناداری کاهش یافت (شکل ۱-د، $p < 0/05$). این شاخص برای ماهیان تیمار شده با گل میخک در تمامی غلظت‌ها به طور معناداری کم‌تر و حدود ۲۰۰ حرکت بود (شکل ۱-د، $p < 0/05$). تلفاتی تا ۴۸ ساعت پس از احیا در هیچ یک از گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد. روش‌های شیمیایی القای بیهوشی، بیش‌ترین کاربرد را در زمینه آبی‌پروری دارد. ترکیبات شیمیایی را می‌توان از طریق تزریق داخل صفاقی، داخل عضلانی، غوطه‌وری، خوراکی یا حتی از طریق منجر وارد بدن جاندار کرد، با این وجود روش حمام در آب محتوای داروی بیهوشی، مرسوم‌ترین روش القای بیهوشی در آبزیان محسوب می‌شود. عصاره ریشه سنبل‌الطیب قادر به بیهوش کردن گربه ماهی پنگوسی بود، با این وجود اثر القاکننده آن بسیار کم‌تر از عصاره گل میخک بود. Sadigh Eteghad و همکاران (۲۰۰۸) نیز نتایج مشابهی را با غلظت‌های برابر سنبل‌الطیب برای بیهوشی ماهی طلایی گزارش کردند. عوامل متعددی علاوه بر غلظت و نوع ترکیب شیمیایی بر کارایی ترکیبات بیهوش‌کننده مؤثرند که از آن جمله می‌توان به گونه ماهی، مرحله زیستی، دمای آب و روش عصاره‌گیری اشاره کرد (Ackerman et al., 2005). کاهش زمان لازم تا بیهوشی معمولاً با افزایش غلظت ماده بیهوش‌کننده مشاهده می‌شود. Sudagar و همکاران

(۲۰۰۹) و Beikzadeh و همکاران (۲۰۱۲) نتایج مشابهی را در خصوص ماهی کلمه (*Rutilus rutilus*) و تاس ماهی استرلیاد با استفاده از گل میخک گزارش کردند. کاهش نداشتن معنادار زمان بیهوشی با وجود افزایش غلظت، شاید نشان‌دهنده عدم تغییر غلظت مواد مؤثر با روش عصاره‌گیری توصیف شده باشد. از این‌رو روش‌های دیگر عصاره‌گیری نظیر عصاره هیدروالکلی پیشنهاد می‌شود. درباره ارتباط بین غلظت ماده بیهوشی و زمان بازگشت از بیهوشی نتایج متناقضی منتشر شده است. Sadigh Eteghad و همکاران (۲۰۰۸)، رابطه معکوس بین دوز ماده بیهوش‌کننده و زمان احیا در ماهی طلایی گزارش کردند. نتایج مشابهی در خصوص کپور معمولی نیز گزارش شده است (Soltani, 2007). با این وجود مطالعات Gomez و همکاران (۲۰۰۱) نشان دادند که زمان بازگشت از بیهوشی در ماهیانی که تحت تأثیر مقدار بالاتری از ماده بیهوشی بنزوکائین قرار گرفته‌اند، بیش‌تر است. به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها به دلیل عملکرد متفاوت ماده بیهوشی (نوع مواد مؤثر)، نوع گونه ماهی و حتی شرایط آزمایش باشد. نتایج کلی بیانگر قابلیت سنبل‌الطیب به عنوان داروی بیهوشی در گربه ماهی پنگوسی بود، اما به دلیل زمان طولانی بیهوشی و بازگشت از بیهوشی استفاده از آن با شرایط توصیف شده در این آزمایش توصیه نمی‌شود.



احیا، (ب) متوسط تعداد حرکات سرپوش آبششی تا رسیدن به مرحله ۴ بیهوشی، (ج) متوسط تعداد حرکات سرپوش آبششی تا احیا و (د) غلظت های مختلف هر ترکیب دارای حداقل یک حرف مشابه، بدون اختلاف معنادار هستند ($p > 0.05$). حروف بزرگ و کوچک به ترتیب برای مقایسه درون گروهی غلظت های مختلف گل میخک و سنبل الطیب استفاده شدند. * اختلاف معنادار بین غلظت یکسان دو ترکیب ($p < 0.05$).

Journal of Animal and Veterinary Advances, 9: 2377-2383.

Komori, T., Matsumoto, T., Motomora, E. and Shiroyama, T. 2006. The sleep-enhancing effect of valerian inhalation and sleep shortening effect of lemon inhalation. *Chemical Senses*, 31: 731-737.

SadighEteghad, S., Ghovami, S., Mortazavi, S., Mortazavi, J. and Mirzaie, H. 2008. Effect of *Valerian officinalis*, *Melissa officinalis*, *Papavers amniferum*, *Papaver bracteatum* in *Carassius auratus*. *Iranian Journal of Fisheries Science*, 17 (1): 91-98.

Soltani, M. 2007. Effect of Carnation in anesthetics in some species of farmed fish. Ecological Institute of Caspian Sea, pp.36.

Sudagar, M., Mohammadizarejabada, A., Mazandarania, R. and Pooralimotlagha, S. 2009. The efficacy of clove powder as an anesthetic and its effects on hematological parameters on roach (*Rutilus rutilus*). *Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition*, 1(1): 1-5.

Velisek, J., Svobodova, Z., Piackova, V., Groch, L. and Nepejchalova, L. 2005. Effects of clove oil anesthesia on common carp (*Cyprinus carpio* L.). *Veterinarni Medicina*, 50 (6): 269-275.

Weber, R. A., Pérez-Maceira, J. J., Peleteiro, J. B., García-Martín, L. and Aldegunde, M. 2011. Effects of acute exposure to 2-phenoxyethanol, clove oil, MS-222, and metomidate on primary and secondary stress responses in Senegalese sole (*Solea senegalensis* Kaup, 1858). *Aquaculture*, 321: 108-112.

منابع

Ackerman, P. A., Morgan, J. D. and Iwama, J. K. 2005. Anesthetics American Physiological Appendix to CCAC guidelines on: The care and use of fish in research, teaching and testing. Canadian Council on Animal Care. Ottawa, Canada. *Physiological Genomics*, 21: 105-111.

Bagheri, T. and Imanpour, M.R. 2011. The efficacy, physiological responses and hematology of Persian sturgeon, *Acipenser persicus*, to clove oil as an anesthetic agent. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 11: 477-483.

Beikzadeh, A., PaykanHeyrati, F. and Mosavi Nejad, M. 2012. The effect of clove powder (*Eugenia caryophyllata*) in *Acipenser ruthenus*. Seventeen National Conference and Fifth International Conference of Biology in Kerman.

Gholipour Kanani, H., Mirzargar, S.S., Soltani, M., Ahmadi, M., Abrishamifar, A., Bahonar, A., Yousefi, P., Graham, A. R. and Johnston, H. 2003. Dietary chemicals and brain function. *Journal & Proceedings of the Royal Society of New South Wales*, 135: 57-71.

Gomez, L. C., Adriana, R., Lopez, N. P., Roubach, R. and Lima, C. 2001. Efficacy of Benzocaine as an anesthetic in juvenile Tambaqui, *Colossoma macropomum*. *Journal of the World Aquaculture Society*, 32 (4): 426-429.

Hajibeglou, A. and Sudagar, M. 2010. Effects of using *Valeriana officinalis* extract during transportation of Swordtail, *Xiphophorus hellari*.

Comparison of sedation in *Pangasius sutchi* using *Valerian officinalis* and *Eugenia caryophylla* extracts

Maryam Yaghobi¹, Fatemeh Paykan Heyrati^{2*}, Salar Dorafshan² and Samad Bahrami Babaheydari¹

1- M.Sc. student, Department of Fisheries Sciences, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan

2- Assistant Professor, Department of Fisheries Sciences, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan

*Corresponding Author: fheyрати@cc.iut.ac.ir

Received: 2013/5/28

Accepted: 2013/10/22

Abstract:

The effects of valerian, *Valerian officinalis*, and clove, *Eugenia caryophylla*, extracts as anesthetic chemicals were investigated on *Panga siussutchi* (12.95 ± 0.92 mm, 16.85 ± 3.52 g). The fish were divided in 6 groups, each including 5 individuals and exposed to various concentrations (2, 3 and 4 g/lit) of clove and/or valerian extract. The mean time to induce sedation, the mean time to return and the mean number of opercular gill pulses to sedate and recover were measured. For both groups, the mean time to sedation was decreased by increasing the dose of the extract. In general, the mean time to onset of anesthesia for clove group was significantly lower than valerian. The mean number of opercular gill pulses during the sedation time was not significantly changed between different dose of clove, while it declined significantly by elevating the valerian doses ($p < 0.05$). There was no mortality in both groups. Although *V. officinalis* extract could cause sedation in the fish, it needed relatively longer time to affect than clove, so it may not be a useful compound for sedation in *P. siussutchi*.

Keywords: *Pangasius sutchi*, *Valerian officinalis*, *Eugenia caryophylla*, anesthetize.